

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-Rp

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je **Loratadin-ratiopharm 10 mg** a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete **Loratadin-ratiopharm 10 mg** užívat
3. Jak se **Loratadin-ratiopharm 10 mg** užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchování přípravku **Loratadin-ratiopharm 10 mg**
6. Další informace

LORATADIN-RATIOPHARM 10 mg

tablety

(Loratadinum)

- Léčivou látkou je loratadinum 10 mg v jedné tabletě
- Pomocné látky jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, magnesium-stearát.

Držitel rozhodnutí o registraci:

ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

Výrobce:

Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

1. CO JE LORATADIN-RATIOPHARM 10 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Loratadin, léčivá látka přípravku **Loratadin-ratiopharm 10 mg**, je látka zabraňující působení histaminu a tím rozvoji alergických reakcí. Loratadin v obvyklých léčebných dávkách nemá tlumivý (sedativní) účinek na nervový systém, proto neovlivňuje psychomotorickou výkonnost a nezpůsobuje ospalost.

Loratadin-ratiopharm 10 mg se užívá při léčbě alergické rýmy, tlumí její příznaky, jako je kýchání, výtok z nosu, svědění v nose, svědění a pálení očí. Dále se užívá při léčbě příznaků chronické kopřivky, jako je svědění, zarudnutí a vyrážka na kůži.

Loratadin-ratiopharm 10 mg mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 2 let s hmotností vyšší než 30 kg.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LORATADIN-RATIOPHARM 10 mg UŽÍVAT

Neužívejte Loratadin-ratiopharm 10 mg:

- jestliže jste precitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku.

Zvláštní opatření při užívání přípravku Loratadin-ratiopharm 10 mg je zapotřebí:

- jestliže trpíte vážnou jaterní poruchou, lékař Vám upraví dávkování.

Loratadin-ratiopharm 10 mg ovlivňuje výsledky kožních testů a proto je třeba 2 dny před jejich provedením užívání přípravku přerušit.

Užívání přípravku Loratadin-ratiopharm 10 mg s jídlem a pitím:

Tablety mohou být užívány nezávisle na jídle.

Těhotenství

Porad'te se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek **Loratadin-ratiopharm 10 mg** by v těhotenství neměl být užíván.

Kojení

Porad'te se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek **Loratadin-ratiopharm 10 mg** by během kojení neměl být užíván.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Přípravek **Loratadin-ratiopharm 10 mg** neovlivňuje pozornost při řízení dopravních prostředků a obsluze strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Loratadin-ratiopharm 10 mg:

Přípravek obsahuje laktózu. Pokud u Vás byla zjištěna nesnášenlivost některých cukrů, porad'te se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Loratadin nezvyšuje účinek alkoholu.

3. JAK SE LORATADIN-RATIOPHARM 10 mg UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), porad'te se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklé dávkování je následující:

Dospělí a mladiství starší než 12 let užívají 1x denně 1 tabletu.

Děti od 2 do 12 let s hmotností vyšší než 30 kg: užívají 1x denně 1 tabletu.

Přípravek **Loratadin-ratiopharm 10 mg** není určen pro děti mladší než 2 roky nebo s hmotností nižší než 30 kg. U pacientů s těžkou poruchou funkce jater lékař upraví dávkování.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku **Loratadin-ratiopharm 10 mg** je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Loratadin-ratiopharm 10 mg, než jste měl(a):

Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem se porad'te s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Loratadin-ratiopharm 10 mg:

Při náhodném vynechání dávky je třeba ji užít co nejdříve. Nezdvojujte však následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Následky přerušeni léčby přípravkem Loratadin-ratiopharm 10 mg:

Přípravek může být nutné užívat dlouhodobě. Nepřerušujte léčbu bez vědomí lékaře, příznaky onemocnění by se mohly zhoršit.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i **Loratadin-ratiopharm 10 mg** nežádoucí účinky.

K nežádoucím účinkům přípravku **Loratadin-ratiopharm 10 mg** patří bolest hlavy, nervozita, únava, ospalost a zvýšená chuť k jídlu. Velmi zřídka se mohou vyskytnout závratě, rychlý nebo nepravidelný

srdeční rytmus, nevolnost, sucho v ústech, zánět žaludku, abnormální funkce jater, vypadávání vlasů, anafylaxe (prudká reakce z přecitlivělosti) a alergické kožní reakce (vyrážka, svědění). Případný výskyt těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte svému lékaři. Jestliže se u vás projeví některý z nežádoucích účinků anafylaktických a alergických (vyrážka, svědění, dušnost), přerušete užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU LORATADIN-RATIOPHARM 10 mg

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Velikost balení: 10, 20, 30, 50 a 100 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Datum poslední revize textu:
29.12. 2010